agroenzymas.com

Hacer de tus sueños
una historia de éxito.

Agromil® PLUS

CON TECNOLOGÍA ReactMAX

La CPPU más vendida del mundo, con la mayor efectividad gracias a su tecnología ReactMAX*

Composición:
Forclorfenurón 0,204 % p/v

Agroenzymas®

*Veritrade, Análisis importaciones CPPU, México, Centro y Sudamérica 2016-2019

Biorregulador **para el incremento del tamaño y uniformidad de los frutos.** Cuenta con la **tecnología ReactMax**, basada en compuestos estimulantes y cofactores de crecimiento que aseguran:

- **Mayor efectividad del ingrediente activo.**
- **Alta solubilidad y estabilidad en agua.**
- **Compatibilidad con fitosanitarios.**
- **Bajo contenido de elementos no deseados.**

Cuadro de recomendaciones

Cultivo	Dosis ml / L de agua	Época de aplicación
Kiwi	2	Para mejorar uniformidad y vigor de brote: al inicio de la brotación.
	1.5	Para incrementar diámetro de ovario a la floración y potenciar mayor tamaño de fruto a cosecha: entre 45-35 días antes de plena floración.
	2 – 3	Para incrementar calibre de fruta: de 2-3 semanas después de la cuaja. Puede fraccionar la dosis en 2 o 3 aplicaciones dependiendo uniformidad y tamaños.
Uva de mesa	1 – 6	Para mejorar la estructura y vigor de racimo e incrementar diámetro de ovario a la floración: desde el inicio de la brotación y hasta 20 días antes de iniciar plena floración o cuando haya 8 hojas bien expandidas en el brote (máximo 3 ocasiones por ciclo, sin acumular más de 6 ml en esta etapa). Utilizar la dosis más baja en variedades que ralean naturalmente y la alta en variedades que ralean químicamente o a mano.
Red Globe	2 – 4	Para uniformizar el calibre de bayas dentro del racimo: en mezcla con la dosis de ácido giberélico en la segunda o tercera entrada de las aplicaciones de crecimiento. Realizar la aplicación antes de los 25 días después de plena floración (1-2 por temporada). Utilizar la dosis mayor cuando haya existido un buen raleo y la planta se encuentre equilibrada.
Thompson Seedless, Superior Seedless, Princess	1.5 – 3	
Flame Seedless, Crimson Seedless	1 – 2	
Viñas	1 – 4	Para evitar corredura de racimo en vides viníferas: desde 20 días antes de floración. (1-2 aplicaciones por ciclo).
Arándano	2 – 6	Para incrementar el calibre de la fruta: 1ª aplicación: 25-15 días antes de plena floración (70 % de ramillete expuesto – 5 % de floración). 2ª aplicación: 10-15 días después de plena floración, con un mojamiento de 500 L / ha (máximo 4 por temporada). Utilizar la mayor dosis cuando se busque mayor calibre de fruta.

Red Globe
Distribución calibres

Resultados variedad Red Globe
Localidad: Copiapó, III Región



	Calibres									
Testigo comercial %	1	4	6	26	25	14.5	16.5	0.5	5.5	1
Agromil®PLUS ReactMAX %	-	-	-	1	15	20.5	41.5	1.5	19.5	1